

# 液体けい酸加里肥料 タフゲン

## ●茎葉を硬く丈夫にします。

- (1) 芝のスリ切れ等からの回復を早めます。パッティングクオリティーが向上します。
- (2) 水稻の調節肥として使用しますと、倒伏防止やイモチ病の予防等に効果があります。また、水口施肥により省力化にもなります。
- (3) 果菜類（特に接木）の耐病性をとくに高めます。

## ●各種の微量要素が入っていますので、分茎の促進に役立ちます。

## ●鉄分を補給し、作物を健全に育てます。

## ●過剰な窒素吸収を抑え、バランスのよい生育を促します。

## ●土中の有用微生物の活性を高め、作物の生育を助けるとともに土壌の改善に役立ちます。

### 施用方法

芝 生…50～100倍液を、㎡当たり 1 ℓ の割合で 1 カ月に 1 回程度散布して下さい。

水 稲…原液を水口から、やや多めの点滴で水とともに10a当たり20kgを流し込んで下さい。

※施用前に落水し、施用後は水深 5 ～ 6 cm になるように調節して下さい。

果菜類…育苗期800～1000倍、生育中期500～600倍、収穫期300～400倍に希釈し、10a当たり200ℓを1カ月に2～3回、葉面散布して下さい。

危険

強アルカリ性  
〈PH11〉



保護メガネ着用



ゴム手袋着用



混合禁止



子供注意

### 取扱い上の注意

★眼に入ったり皮膚に付かないように、保護メガネ・ゴム手袋をご使用下さい。

[そのままにすると視力が損なわれたり、皮膚がただれます]

★噴霧使用するときは、保護マスクを使用し、眼や顔にかからないようにして下さい。

★農薬や他の肥料との混合使用はしないで下さい。

[有害ガスが発生したり、沈殿物が生成することがあります]

### 応急措置

★眼に入ったときは、すぐに、流水で10分以上洗眼し医師の診察を受けて下さい。

★皮膚に付いたときは、すぐに、「ぬめり」がなくなるまで十分に洗い、異常があるときは医師の診察を受けて下さい。

保管方法……★密閉して幼児の手の届かない涼しい所に保管して下さい。

廃棄方法……★1000倍以上に薄めて土壌中に廃棄して下さい。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地