

〈リンサン〉×〈苦土〉の相乗作用

リンマグ液肥

タイミンク.2号

〈チッソ〉 〈リンサン〉 〈カリ〉 〈苦土〉

キュービテナー：20kg入り

0-17-0-3



多木肥料

タイミング.2号

〈チッソ〉 〈リンサン〉 〈カリ〉 〈苦土〉

0-17-0-3

特 長

- 液状ですから、簡単に灌水施肥できます。
- リン酸、苦土の成分はすべて水溶性ですから、作物にすぐ吸収されます。
- リン酸と苦土の相乗作用により、吸収利用率が高まります。
- 低温、低日照時および軟弱徒長時でも樹勢安定に効果があります。

使用方法と効果

作物	使用時期	施用量	希釈倍率	回数	効果
野菜	育苗期 (定植7~10日前)		葉面散布 500倍	適宜施用	・健苗育成
	生育期	5~10kg	灌水施肥	適宜施用	・活着促進 ・樹(草)勢の安定 ・成り疲れ防止 ・品質向上
		20kg/10a	灌水施肥	適宜施用	・着果(花)安定 ・徒長防止
果樹	成熟期前 花芽分化期前	10~20kg/10a	灌水施肥	適宜施用	・成熟促進 ・花芽分化促進
花卉	定植後 花芽分化期前	40kg/10a	灌水施肥	適宜施用	・発根促進 ・花芽分化促進
芝	発根初期	3~10g/m ²	灌水施肥 100倍以上	適宜施用	・発根促進

取扱い上の注意

- ◆眼に入らないようにご注意ください。眼に入ったときは、すぐに水でよく洗い流してください。
 - ◆石灰硫黄合剤等のアルカリ性農薬や他の肥料と混用しないでください。混合すると有毒有害なガスが発生する恐れがあり、また、沈殿物が生成することがあります。
- 保管方法 ◆50℃以上または0℃以下の所で長く保管しないでください。
◆密閉して幼児の手の届かない涼しい所に保管してください。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地