

尿素苦土燐安系高度化成

タキホスカ555

チ ッ ソ リ ン 酸 カ リ

15-15-15

ポリ袋：20kg 入り

保証 苦土2.0% マンガン0.2% ほう素0.15%

〈特 長〉

- 平行型成分の使いやすい苦土燐安系高度化成です。
- 燐安を主体とした肥料ですので、作物に無駄なく吸収されます。
- リンサンと苦土の相乗効果により高い肥効をしめします。
- 稲、麦、野菜、果樹そのほかあらゆる作物に適します。

〈施肥量の目安(kg/10aあたり)〉 ※土壌・作物・品種などに合わせて適宜加減してください

作物名	元 肥	追 肥	備 考
水 稻	30~40	10	追肥は田植後7~15日（穂肥は別途施用）
麦	30	40	追肥は2回に分肥
キャベツ	80~90	120~160	追肥は3回に分肥
ハクサイ	100~150	110~120	追肥は3回に分肥
タマネギ	50	60~120	追肥は3回に分肥
トマト	60~100	140	追肥は3回に分肥、ただし生育状況を見て加減
キュウリ	80~130	120~140	追肥は4回に分肥、ただし生育状況を見て加減
馬 鈴 薯	60~70	60	追肥は第1回中耕のときに施用
ミ カ ン	60~80	80~100	追肥は2回に分肥（春・秋）
ブ ド ウ	40~80	30~60	追肥は3回に分肥（春・夏・秋）
ナ シ	60~80	40~60	追肥は3回に分肥（春2回・秋1回）
リ ン ゴ	60~80	40~60	追肥は3回に分肥（春2回・秋1回）
モ モ	40~80	30~60	追肥は4回に分肥（春・夏2回・秋）

保管・使用上の注意

- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 施肥作業後は、洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流して下さい。
- 石灰などのアルカリ資材と接触させないで下さい。アンモニアガスが発生し、植害を起すことがあります。