

おいしいお米をみのらせます

〈燐安系高度化成〉

多木硫加燐安12号

チッソ

リンサン

カリ

ポリ袋：20kg入

13-17-12

リンサンの効きめの高い肥料です。
冷害や病害に強い稲を育て、稔実
のよいうまい米を穫りましょう。

多木肥料

多木硫加磷安12号水稻施肥設計例

東日本（標準）

（10アール当たり）

	肥料名	施肥量(kg)	施肥法
元肥	タキグリーン	100	} 全層施肥
	堆肥	700	
	マグホス	40	} 代かき前
	多木硫加磷安12号	30 ~ 40	
追肥	多木硫加磷安12号	20	田植7~10日後
調節肥	マグホスまたは カスタム	20 ~ 30	出穂40~35日前
穂肥	(1) コーボしき島9号	15	出穂20~18日前
	(2) コーボ九重9号	15	出穂10日前
実肥	銀河1号 のいずれか	10 ~ 15	出穂7~10日後

西日本（標準）

（10アール当たり）

	肥料名	施肥量(kg)	施肥法
元肥	タキグリーン	100	} 全層施肥
	堆肥	700	
	マグホス	40	} 代かき前
	多木硫加磷安12号	30	
追肥	多木硫加磷安12号	15 ~ 20	田植10~15日前
調節肥	マグホスまたは カスタム	20 ~ 30	出穂40日前
穂肥	(1) コーボしき島9号	20	出穂25~20日前
	(2) コーボ九重9号	20	出穂15~10日前
実肥	銀河1号 のいずれか	15	出穂7~10日後

〈栽培上の注意〉

1. 穂肥には必ずコーボしき島、コーボ九重または銀河1号を施用する。
2. 水のかけひきに注意して根腐れを防止する。

〈保管・使用上の注意〉

- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 施肥作業後は、洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流して下さい。
- 石灰などのアルカリ資材と接触させないで下さい。アンモニアガスが発生し、植害を起すことがあります。
- 施肥機の取扱い説明書をよく読んで使用して下さい。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地